



# Fiche produit

## Vitalife For Calves®



6 x 1 pot de 1 dose (125g)



Seau de 20 doses (2,5kg)

### Espèces cibles

**Bovins**

### Utilisation

Aliment complémentaire destiné à **stabiliser l'équilibre hydrique et électrolytique**. Son utilisation est prévue en cas de risque de **troubles digestifs** (diarrhée), pendant la période concernée ou au cours du rétablissement. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant toute utilisation et avant de prolonger la période d'utilisation.

### Composition

**VITALIFE FOR CALVES®** est composé principalement d'électrolytes et d'hydrates de carbone facilement assimilables avec une haute capacité tampon. **Composition:** dextrose, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium. **Constituants analytiques (%):** protéines brutes (0.7%), cellulose brute (0%), matières grasses brutes (0.1%), cendres brutes (32.5%), sodium (11.8%), potassium (1.8%), chlorure (7.6%), dextrose (36.9%), bicarbonate (22.5%). **Additifs (par kg):** 3a700 Vitamine E 150 IU, composants aromatiques 10 g.

### Instructions d'utilisation

#### SEAU DE 20 DOSES (2,5kg)

##### **Veau apte à boire**

Si le veau est apte à boire : préparer une solution fraîche en mélangeant une demi dosette avec 2L de lait à 38°C et agiter. Donner au veau avec le biberon. Répéter la procédure 12 h plus tard.

#### POT D'UNE DOSE UNIQUE (125g)

##### **Veau apte à boire**

Préparer une solution fraîche en complétant le contenu du pot avec de l'eau. Remplir jusqu'au repère et bien agiter. Verser la moitié du contenu dans un biberon et compléter jusqu'à 2L avec du lait à 38°C. Donner le biberon au veau. Répéter l'opération 12 h plus tard avec le reste du pot qui aura préalablement été conservé au frais.

##### **Veau non apte à boire**

Si le veau n'est pas apte à boire : préparer une solution fraîche en mélangeant une dosette entière avec 2L d'eau à 38°C et bien agiter. L'administrer au veau par l'intermédiaire d'une sonde. Répéter la procédure 12 h plus tard.

##### **Veau non apte à boire**

Préparer une solution fraîche en complétant le contenu du pot avec de l'eau. Remplir jusqu'au repère et bien agiter. Verser la totalité du contenu dans un biberon et compléter à 2L avec de l'eau à 38°C. Donner la solution au veau par l'intermédiaire d'une sonde. Répéter la procédure 12h plus tard.

### Présentation

- Pot de **125g** (1 dose) x6
- Seau de **2,5kg** (20 doses)

Disponible en centrales d'achats